

## ***О мерах профилактики педикулёза дома и в организованных детских коллективах***

По данным Всемирной организации здравоохранения постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов людей во всем мире. Педикулёз является самым распространённым паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Педикулёз - это паразитарное заболевание кожи и волос. Основным симптомом педикулёза является зуд кожи, который возникает в результате укуса человека вошью и попадания в ранку слюны паразита, что и вызывает местное раздражение. Со временем из-за зуда на коже появляются экскориации (расчесы), корочки и мокнувшие ранки. Самой явной причиной появления вшей считается несоблюдение правил личной гигиены, именно поэтому большинство людей думает, что вши могут завестись только у асоциальных личностей, однако это не верно, ведь педикулезом может заразиться даже самый чистоплотный ребенок, живущий в комфортных условиях. Основным способ заражения педикулезом - это непосредственный контакт здорового ребенка с больным. Чаще всего дети приносят вшей из различных детских учреждений.

Эпидемиологическая обстановка по педикулезу на территории Ярославской области в настоящее время остается актуальной.

В 2017 году за 7 месяцев в Ярославской области зарегистрировано 436 случаев педикулёза (33,93 на 100 тысяч населения)

### **Показатели пораженности педикулёзом населения за 2012-2016 г.г.**

|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г  |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| Число случаев по Ярославской области                     | 1391    | 885     | 865     | 951     | 794    |
| Показатель по Ярославской области на 100 тысяч населения | 104,29  | 67,54   | 67,17   | 73,94   | 61,88  |
| Показатель по РФ   | 185,9   | 180,3   | 192,6   | 166,95  | 145,62 |

Наибольший процент пораженности педикулезом в структуре осмотренных отмечается у учащихся общеобразовательных школ (0,13%) и у детей дошкольных образовательных организаций (0,04%).

Мероприятия, проводимые в детских учреждениях, должны быть направлены на создание санитарно-гигиенических условий, предупреждающих занос и распространение педикулёза.

В организованный детский коллектив запрещается принимать детей, пораженных педикулезом (вши, гниды). При выявлении детей, пораженных педикулезом, они отстраняются от посещения дошкольной образовательной организации. Прием детей в дошкольные образовательные организации допускается при наличии медицинской справки об отсутствии педикулёза.

При обнаружении педикулёза обучающиеся на время проведения лечения отстраняются от посещения организации. Они могут быть допущены в общеобразовательные организации только после завершения комплекса лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей справкой от врача.

За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал. В целях профилактики педикулёза среди детей организованных коллективов необходимо:

- повысить ответственность администрации и педагогов школ по обеспечению мер профилактики педикулёза;
- обеспечить своевременное принятие необходимых мер по ликвидации выявленных очагов педикулёза;
- проводить постоянную разъяснительную работу с родителями и учащимися школ по мерам профилактики педикулёза, используя различные формы (распространение памяток, диктанты, изложения, родительские собрания и др.).

Обращаем внимание населения и медицинских работников медицинских организаций и детских учреждений на своевременное выявление очагов педикулёза, в особенности после каникул, когда происходит активное общение детей во время массовых детских мероприятий.

В целях своевременного выявления педикулёза, родителям рекомендуется регулярно осматривать своих детей. Чтобы обезопасить себя и своих детей необходимо соблюдать правила личной гигиены (волосы ежедневно тщательно расчёсывать, своевременно мыть и стричь; не допускать передачи личной расчески другим лицам; ежедневно мыться, менять нательное и постельное бельё по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней).

**Если вы выявили педикулез необходимо:**

- **проверить всех членов семьи в тот же день, как обнаружили педикулез у Вашего ребенка;**
- **обработать волосистую часть головы педикулицидным средством, применяя его в соответствии с инструкцией к препарату;**
- **пропустить ватный жгутик или нитку сквозь зубцы частого гребня, который необходимо обильно смочить теплым 6% уксусом и вычесать гниды, затем промыть волосы;**
- **обработать расчески, заколки, щетки пораженного методом протирания 70% спиртом или обдать кипятком.**

***Будьте внимательны к себе и окружающим!***